



水稲における後期病害虫防除のポイント

気象状況に注意し万全の本田防除を



上位葉の葉いもち病斑と穂いもち

いもち病は、穂いもち病斑と穂いもちの発生を抑えることが重要です。穂いもち病は、穂の基部から発生し、穂の上部まで広がる特徴があります。穂いもち病は、穂の基部から発生し、穂の上部まで広がる特徴があります。



紋枯病の多発生株

いもち病は、穂いもち病斑と穂いもちの発生を抑えることが重要です。穂いもち病は、穂の基部から発生し、穂の上部まで広がる特徴があります。穂いもち病は、穂の基部から発生し、穂の上部まで広がる特徴があります。



ヒメトビウンカ



ゆうれい症状

(虫害写真：中央農業研究センター 平江雅宏氏 提供)

いもち病は、穂いもち病斑と穂いもちの発生を抑えることが重要です。穂いもち病は、穂の基部から発生し、穂の上部まで広がる特徴があります。穂いもち病は、穂の基部から発生し、穂の上部まで広がる特徴があります。

水稲の病害虫防除に 協友アグリの水稲用空中散布剤



いもち病、紋枯病の防除に **アミスター-Eイトフロアブル**

いもち病の防除に **ハンフラスフロアブル**

いもち病、紋枯病、カメムシ類、ウンカ類の防除に **アミスター-トレボンSE**
アミスター-アクタラSC

いもち病、紋枯病の防除に **ハンフラスバリダフロアブル**

カメムシ類、ウンカ類の防除に **ダントツフロアブル**

いもち病、カメムシ類、ウンカ類の防除に **ハンフラスダントツフロアブル**

いもち病、カメムシ類、ウンカ類の防除に **ラフサイドダントツフロアブル**

いもち病、紋枯病、カメムシ類、ウンカ類の防除に **ハンフラスバリダダントツフロアブル**



JAグループ 農協 全農 経済連 協友アグリ株式会社

防除は丸山でやる。

適期防除は良質米生産の要です。

丸山 120th Anniversary

フルキャビンハイクリブーム BSA-650/950シリーズ

自走ラジコン動噴 MSA755DR6S-Y/K

株式会社丸山製作所

本社/〒101-0047東京都千代田区千代田3-4-15 TEL(03)3252-2281(営・代表) http://www.maruyama.co.jp

お客様相談窓口(丸山サポートセンター) 通話料無料0120-898-1114

水稲、美しく。

商品価値の高いお米づくりを応援します。

水稲場面の基幹殺虫剤

スタークル 殺虫剤・粉剤DL 液剤10 1キロ口粒剤

三井東亜 アルバリン 殺虫剤 粉剤DL

スタークルメイト 殺虫剤 液剤10 1キロ口粒剤

トレボン 殺虫剤 液剤DL スカイMC・MC エアーEW

三井化学アグロ株式会社

東京都中央区日本橋1-19-1 日本橋タイパビルディング

ホームページ http://www.mitsui-agro.com/

